

表 1409 大腿骨頸部骨折の既往 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

Non-HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満	16		16		2	18
(%)	(100.0)		(100.0)			
50～	97		97		17	114
(%)	(100.0)		(100.0)			
70～	280	12	292	3	56	351
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
90～	568	13	581	5	74	660
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
110～	666	9	675	7	115	797
(%)	(98.7)	(1.3)	(100.0)			
130～	555	12	567	4	91	662
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
150～	363	14	377	4	55	436
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
170～	227	3	230	3	30	263
(%)	(98.7)	(1.3)	(100.0)			
190～	106	1	107		13	120
(%)	(99.1)	(0.9)	(100.0)			
210～	72	4	76		14	90
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
合計	2,950	68	3,018	26	467	3,511
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
記載なし	2,781	66	2,847	29	2,554	5,430
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
総計	5,731	134	5,865	55	3,021	8,941
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
平均	128.58	132.56	128.67	125.27	127.37	128.47
標準偏差	37.74	46.96	37.96	30.30	38.75	38.01

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査