

表 1410 大腿骨頸部骨折の既往 収縮期血圧(mmHg)別 (腹膜透析患者)

収縮期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)					1	1
60～ (%)	12 (100.0)		12 (100.0)		1	13
80～ (%)	101 (94.4)	6 (5.6)	107 (100.0)	1	16	124
100～ (%)	555 (97.9)	12 (2.1)	567 (100.0)	3	71	641
120～ (%)	1,334 (97.9)	28 (2.1)	1,362 (100.0)	17	137	1,516
140～ (%)	1,390 (98.4)	23 (1.6)	1,413 (100.0)	13	153	1,579
160～ (%)	624 (98.7)	8 (1.3)	632 (100.0)	5	84	721
180～ (%)	189 (98.4)	3 (1.6)	192 (100.0)	3	22	217
200～ (%)	25 (92.6)	2 (7.4)	27 (100.0)		4	31
220～ (%)	8 (100.0)		8 (100.0)		2	10
合計 (%)	4,238 (98.1)	82 (1.9)	4,320 (100.0)	42	491	4,853
記載なし (%)	1,493 (96.6)	52 (3.4)	1,545 (100.0)	13	2,530	4,088
総計 (%)	5,731 (97.7)	134 (2.3)	5,865 (100.0)	55	3,021	8,941
平均	140.93	137.52	140.86	141.62	142.26	141.01
標準偏差	22.67	25.18	22.72	20.10	24.44	22.88

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査