

表 1411 大腿骨頸部骨折の既往 拡張期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

拡張期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
20～ (%)	13 (92.9)	1 (7.1)	14 (100.0)		1	15
40～ (%)	311 (94.5)	18 (5.5)	329 (100.0)	3	43	375
60～ (%)	1,820 (98.1)	35 (1.9)	1,855 (100.0)	18	192	2,065
80～ (%)	1,126 (98.9)	12 (1.1)	1,138 (100.0)	14	144	1,296
90～ (%)	629 (98.3)	11 (1.7)	640 (100.0)	6	68	714
100～ (%)	300 (98.4)	5 (1.6)	305 (100.0)	1	41	347
120～ (%)	16 (100.0)		16 (100.0)		2	18
140～ (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
合計 (%)	4,217 (98.1)	82 (1.9)	4,299 (100.0)	42	491	4,832
記載なし (%)	1,514 (96.7)	52 (3.3)	1,566 (100.0)	13	2,530	4,109
総計 (%)	5,731 (97.7)	134 (2.3)	5,865 (100.0)	55	3,021	8,941
平均	79.04	73.62	78.94	78.17	79.75	79.01
標準偏差	14.39	16.58	14.45	12.91	14.42	14.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査