

表 1412 大腿骨頸部骨折の既往 脈拍(拍/分)別 (腹膜透析患者)

脈拍	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
40未満	3		3		2	5
(%)	(100.0)		(100.0)			
40～	21	1	22		3	25
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
50～	162	2	164		23	187
(%)	(98.8)	(1.2)	(100.0)			
60～	742	11	753	6	91	850
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
70～	1,080	22	1,102	4	165	1,271
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
80～	898	13	911	3	110	1,024
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
90～	416	11	427	3	51	481
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
100～	170	7	177	3	24	204
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
110～	45		45		7	52
(%)	(100.0)		(100.0)			
120～	18	1	19		1	20
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
合計	3,555	68	3,623	19	477	4,119
(%)	(98.1)	(1.9)	(100.0)			
記載なし	2,176	66	2,242	36	2,544	4,822
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
総計	5,731	134	5,865	55	3,021	8,941
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
平均	78.08	80.29	78.13	79.89	77.73	78.09
標準偏差	13.23	14.20	13.25	15.34	13.31	13.27

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査