

表 1415 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 併用の状況別(腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

併用の状況	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)	6,191 (90.8)	482 (7.1)	16 (0.2)	63 (0.9)	64 (0.9)	6,816 (100.0)	233	845	7,894
PD単独 (%)	4,556 (99.4)	25 (0.5)		1 (0.0)		4,582 (100.0)	40	2,566	7,188
HD(F)単独,PDカテ あり (%)	166 (94.9)	7 (4.0)		2 (1.1)		175 (100.0)		44	219
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	1,050 (98.6)	10 (0.9)		2 (0.2)	3 (0.3)	1,065 (100.0)	25	454	1,544
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	139 (99.3)	1 (0.7)				140 (100.0)	3	31	174
PD.HD併用週3 HD(F) (%)	29 (100.0)					29 (100.0)	1	4	34
PD.HD併用週4 HD(F) (%)	1 (100.0)					1 (100.0)			1
PD.HD併用その他 (%)	55 (100.0)					55 (100.0)	2	14	71
合計 (%)	12,187 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,863 (100.0)	304	3,958	17,125
不明 (%)	2 (100.0)					2 (100.0)		3	5
記載なし (%)									
総計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査