

表 1416 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 性別（腹膜透析の経験があるか現在施行している患者）

性別	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
男性 (%)	7,827 (95.1)	309 (3.8)	12 (0.1)	43 (0.5)	38 (0.5)	8,229 (100.0)	195	2,564	10,988
女性 (%)	4,362 (94.1)	216 (4.7)	4 (0.1)	25 (0.5)	29 (0.6)	4,636 (100.0)	109	1,397	6,142
合計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130
記載なし (%)									
総計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査