

表 1417 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 年齢(歳)別 (腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

年齢	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	61 (100.0)					61 (100.0)		40	101
15歳～ (%)	175 (96.2)	3 (1.6)	2 (1.1)	1 (0.5)	1 (0.5)	182 (100.0)	5	36	223
30歳～ (%)	1,003 (94.9)	43 (4.1)	1 (0.1)	3 (0.3)	7 (0.7)	1,057 (100.0)	25	339	1,421
45歳～ (%)	3,242 (94.3)	154 (4.5)	4 (0.1)	18 (0.5)	20 (0.6)	3,438 (100.0)	70	1,025	4,533
60歳～ (%)	5,673 (94.3)	265 (4.4)	9 (0.1)	38 (0.6)	34 (0.6)	6,019 (100.0)	163	1,841	8,023
75歳～ (%)	1,937 (96.6)	59 (2.9)		5 (0.2)	5 (0.2)	2,006 (100.0)	41	647	2,694
90歳～ (%)	98 (96.1)	1 (1.0)		3 (2.9)		102 (100.0)		33	135
合計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130
不明 (%)									
記載なし (%)									
総計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130
平均	62.04	61.60	55.25	63.94	59.76	61.99	62.28	62.12	62.04
標準偏差	13.62	11.62	15.27	12.37	10.71	13.41	12.40	14.10	13.64

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査