

表 1418 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 透析歴(年)別 (腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

透析歴	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	2,777 (99.3)	18 (0.6)		1 (0.0)	1 (0.0)	2,797 (100.0)	27	1,290	4,114
2年～ (%)	3,165 (97.7)	55 (1.7)		12 (0.4)	9 (0.3)	3,241 (100.0)	52	1,303	4,596
5年～ (%)	3,027 (95.3)	109 (3.4)	2 (0.1)	19 (0.6)	18 (0.6)	3,175 (100.0)	84	824	4,083
10年～ (%)	1,461 (90.0)	123 (7.6)	2 (0.1)	19 (1.2)	19 (1.2)	1,624 (100.0)	55	287	1,966
15年～ (%)	851 (87.6)	97 (10.0)	7 (0.7)	9 (0.9)	7 (0.7)	971 (100.0)	38	134	1,143
20年～ (%)	482 (83.7)	81 (14.1)	2 (0.3)	5 (0.9)	6 (1.0)	576 (100.0)	24	71	671
25年～ (%)	220 (84.0)	35 (13.4)	3 (1.1)		4 (1.5)	262 (100.0)	13	29	304
30年～ (%)	107 (92.2)	4 (3.4)		3 (2.6)	2 (1.7)	116 (100.0)	5	11	132
35年～ (%)	60 (95.2)	2 (3.2)			1 (1.6)	63 (100.0)	3	3	69
40年～ (%)	37 (100.0)					37 (100.0)	3	6	46
合計 (%)	12,187 (94.8)	524 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,862 (100.0)	304	3,958	17,124
不明 (%)	2 (66.7)	1 (33.3)				3 (100.0)		3	6
記載なし (%)									
総計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130
平均	7.02	13.26	17.88	10.72	12.31	7.60	10.89	4.63	6.77
標準偏差	7.33	7.54	6.44	7.14	8.03	7.55	8.66	5.51	7.20

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査