

表 1419 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 原疾患別(腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

原疾患	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
慢性系球体腎炎 (%)	5,140 (93.3)	291 (5.3)	9 (0.2)	34 (0.6)	36 (0.7)	5,510 (100.0)	135	1,445	7,090
慢性腎孟腎炎 (%)	162 (89.5)	15 (8.3)	1 (0.6)		3 (1.7)	181 (100.0)	3	33	217
急速進行性糸球体腎炎 (%)	94 (96.9)	2 (2.1)			1 (1.0)	97 (100.0)	1	34	132
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	73 (90.1)	6 (7.4)		1 (1.2)	1 (1.2)	81 (100.0)	2	6	89
その他の分類不能の腎炎 (%)	91 (97.8)	2 (2.2)				93 (100.0)	2	33	128
多発性囊胞腎 (%)	316 (97.2)	8 (2.5)			1 (0.3)	325 (100.0)	8	99	432
腎硬化症 (%)	1,158 (95.7)	35 (2.9)	1 (0.1)	5 (0.4)	11 (0.9)	1,210 (100.0)	37	385	1,632
悪性高血圧 (%)	129 (94.9)	4 (2.9)		1 (0.7)	2 (1.5)	136 (100.0)	3	41	180
糖尿病性腎症 (%)	3,214 (96.8)	86 (2.6)		14 (0.4)	6 (0.2)	3,320 (100.0)	66	1,207	4,593
SLE腎炎 (%)	93 (91.2)	9 (8.8)				102 (100.0)	1	26	129
アミロイド腎 (%)	11 (91.7)			1 (8.3)		12 (100.0)	2	7	21
痛風腎 (%)	57 (96.6)	1 (1.7)		1 (1.7)		59 (100.0)	1	17	77
先天性代謝異常による腎不全 (%)	25 (89.3)	2 (7.1)		1 (3.6)		28 (100.0)	1	7	36
腎・尿路結核 (%)	7 (100.0)					7 (100.0)		1	8
腎・尿路結石 (%)	20 (95.2)	1 (4.8)				21 (100.0)		4	25
腎・尿路腫瘍 (%)	17 (85.0)	2 (10.0)	1 (5.0)			20 (100.0)		7	27
閉塞性尿路障害 (%)	28 (93.3)	1 (3.3)			1 (3.3)	30 (100.0)	1	9	40
骨髄腫 (%)	7 (100.0)					7 (100.0)		3	10
腎形成不全 (%)	110 (94.8)	6 (5.2)				116 (100.0)	2	26	144
不明 (%)	996 (95.6)	34 (3.3)	1 (0.1)	7 (0.7)	4 (0.4)	1,042 (100.0)	28	425	1,495
再導入 (%)	129 (91.5)	6 (4.3)	2 (1.4)	3 (2.1)	1 (0.7)	141 (100.0)	5	35	181
その他 (%)	312 (95.4)	14 (4.3)	1 (0.3)			327 (100.0)	6	111	444
合計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130
記載なし (%)									
総計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査