

表 1420 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 医療機関別(腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

医療機関	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	580	4				584			756
(%)	(99.3)	(0.7)				(100.0)			
私立大学	661	7		3	1	672	4	576	1,252
(%)	(98.4)	(1.0)		(0.4)	(0.1)	(100.0)			
国立	149				1	150	2	99	251
(%)	(99.3)				(0.7)	(100.0)			
県市町村立	1,564	41	5	15	3	1,628	28	691	2,347
(%)	(96.1)	(2.5)	(0.3)	(0.9)	(0.2)	(100.0)			
社会保険	372	11		1	3	387	7	304	698
(%)	(96.1)	(2.8)		(0.3)	(0.8)	(100.0)			
厚生連	652	25		3	7	687	23	266	976
(%)	(94.9)	(3.6)		(0.4)	(1.0)	(100.0)			
その他公的	1,190	29	1			1,220	30	508	1,758
(%)	(97.5)	(2.4)	(0.1)			(100.0)			
私立総合	480	13	1	1	2	497	4	59	560
(%)	(96.6)	(2.6)	(0.2)	(0.2)	(0.4)	(100.0)			
私立	2,412	113		12	8	2,545	55	838	3,438
(%)	(94.8)	(4.4)		(0.5)	(0.3)	(100.0)			
私立診療所	4,129	282	9	33	42	4,495	151	448	5,094
(%)	(91.9)	(6.3)	(0.2)	(0.7)	(0.9)	(100.0)			
総計	12,189	525	16	68	67	12,865	304	3,961	17,130
(%)	(94.7)	(4.1)	(0.1)	(0.5)	(0.5)	(100.0)			

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査