

表 1422 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 喫煙の有無別(腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

喫煙の有無	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
現在吸っていない (%)	9,684 (94.7)	409 (4.0)	15 (0.1)	57 (0.6)	59 (0.6)	10,224 (100.0)	193	449	10,866
現在吸っている (%)	1,129 (94.9)	53 (4.5)		5 (0.4)	3 (0.3)	1,190 (100.0)	39	69	1,298
合計 (%)	10,813 (94.7)	462 (4.0)	15 (0.1)	62 (0.5)	62 (0.5)	11,414 (100.0)	232	518	12,164
不明 (%)	975 (96.9)	24 (2.4)		4 (0.4)	3 (0.3)	1,006 (100.0)	64	105	1,175
記載なし (%)	401 (90.1)	39 (8.8)	1 (0.2)	2 (0.4)	2 (0.4)	445 (100.0)	8	3,338	3,791
総計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査