

表 1423 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 腹膜透析の経験別（腹膜透析の経験があるか現在施行している患者）

腹膜透析の経験	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
なし (%)									
あり(年末時点でカテーテルあり) (%)	6,310 (98.1)	109 (1.7)		9 (0.1)	3 (0.0)	6,431 (100.0)	81	893	7,405
あり(年末時点でカテーテルなし) (%)	5,514 (90.9)	413 (6.8)	16 (0.3)	59 (1.0)	64 (1.1)	6,066 (100.0)	222	798	7,086
合計 (%)	11,824 (94.6)	522 (4.2)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,497 (100.0)	303	1,691	14,491
不明 (%)	5 (100.0)					5 (100.0)		1	6
記載なし (%)	360 (99.2)	3 (0.8)				363 (100.0)	1	2,269	2,633
総計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査