

表 1424 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 腎移植の回数別(腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

腎移植の回数	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
なし (%)	10,972 (94.8)	458 (4.0)	14 (0.1)	62 (0.5)	66 (0.6)	11,572 (100.0)	276	1,077	12,925
1回 (%)	293 (91.6)	22 (6.9)	2 (0.6)	3 (0.9)		320 (100.0)	10	42	372
2回 (%)	14 (77.8)	3 (16.7)		1 (5.6)		18 (100.0)		3	21
3回 (%)	2 (100.0)					2 (100.0)		1	3
4回以上 (%)									
合計 (%)	11,281 (94.7)	483 (4.1)	16 (0.1)	66 (0.6)	66 (0.6)	11,912 (100.0)	286	1,123	13,321
不明 (%)	11 (84.6)	2 (15.4)				13 (100.0)	7	12	32
記載なし (%)	897 (95.4)	40 (4.3)		2 (0.2)	1 (0.1)	940 (100.0)	11	2,826	3,777
総計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査