

表 1427 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 血流量(ml/分)別(腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

血流量	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	1 (100.0)					1 (100.0)			1
100～ (%)	20 (90.9)	2 (9.1)				22 (100.0)		1	23
120～ (%)	59 (96.7)	1 (1.6)	1 (1.6)			61 (100.0)	2	5	68
140～ (%)	421 (94.0)	19 (4.2)	1 (0.2)	4 (0.9)	3 (0.7)	448 (100.0)	14	48	510
160～ (%)	122 (89.7)	10 (7.4)		2 (1.5)	2 (1.5)	136 (100.0)	11	17	164
180～ (%)	697 (91.2)	53 (6.9)	1 (0.1)	8 (1.0)	5 (0.7)	764 (100.0)	24	67	855
200～ (%)	2,978 (91.9)	201 (6.2)	7 (0.2)	30 (0.9)	24 (0.7)	3,240 (100.0)	111	411	3,762
220～ (%)	1,152 (91.6)	78 (6.2)	5 (0.4)	6 (0.5)	17 (1.4)	1,258 (100.0)	44	148	1,450
240～ (%)	1,388 (92.3)	94 (6.3)	1 (0.1)	14 (0.9)	7 (0.5)	1,504 (100.0)	46	214	1,764
260～ (%)	137 (92.6)	8 (5.4)			3 (2.0)	148 (100.0)	1	10	159
280～ (%)	148 (93.1)	8 (5.0)			3 (1.9)	159 (100.0)	4	10	173
300～ (%)	302 (94.7)	14 (4.4)		1 (0.3)	2 (0.6)	319 (100.0)	3	31	353
350～ (%)	28 (82.4)	5 (14.7)			1 (2.9)	34 (100.0)	1	6	41
400～ (%)	15 (83.3)	2 (11.1)		1 (5.6)		18 (100.0)		6	24
合計 (%)	7,468 (92.1)	495 (6.1)	16 (0.2)	66 (0.8)	67 (0.8)	8,112 (100.0)	261	974	9,347
記載なし (%)	4,721 (99.3)	30 (0.6)		2 (0.0)		4,753 (100.0)	43	2,987	7,783
総計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130
平均	214.54	215.56	202.50	212.42	218.36	214.85	209.66	216.69	214.67
標準偏差	37.74	38.55	30.22	46.87	37.52	37.92	32.51	39.71	37.92

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査