

表 1428 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 HDF希釈方法別（腹膜透析の経験があるか現在施行している患者 透析回数週3回）

HDF希釈方法	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
前希釈 (%)	937 (90.7)	75 (7.3)	2 (0.2)	7 (0.7)	12 (1.2)	1,033 (100.0)	25	122	1,180
後希釈 (%)	208 (89.7)	18 (7.8)	1 (0.4)	2 (0.9)	3 (1.3)	232 (100.0)	9	18	259
前・後希釈 (%)						18 (100.0)	1	2	21
その他 (%)	14 (77.8)	4 (22.2)							
合計 (%)	1,159 (90.3)	97 (7.6)	3 (0.2)	9 (0.7)	15 (1.2)	1,283 (100.0)	35	142	1,460
不明 (%)									
記載なし (%)	5,263 (91.2)	392 (6.8)	13 (0.2)	56 (1.0)	49 (0.8)	5,773 (100.0)	202	756	6,731
総計 (%)	6,422 (91.0)	489 (6.9)	16 (0.2)	65 (0.9)	64 (0.9)	7,056 (100.0)	237	898	8,191

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査