

表 1429 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 身長(cm)別(腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

身長	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
130未満 (%)	65 (94.2)	3 (4.3)			1 (1.4)	69 (100.0)		5	74
130～ (%)	25 (89.3)	2 (7.1)		1 (3.6)		28 (100.0)		4	32
135～ (%)	101 (95.3)	5 (4.7)				106 (100.0)	1	13	120
140～ (%)	351 (94.6)	11 (3.0)		5 (1.3)	4 (1.1)	371 (100.0)	9	64	444
145～ (%)	819 (93.8)	42 (4.8)	2 (0.2)	5 (0.6)	5 (0.6)	873 (100.0)	23	133	1,029
150～ (%)	1,473 (94.2)	75 (4.8)	2 (0.1)	9 (0.6)	5 (0.3)	1,564 (100.0)	33	261	1,858
155～ (%)	1,840 (94.4)	85 (4.4)	3 (0.2)	8 (0.4)	13 (0.7)	1,949 (100.0)	41	291	2,281
160～ (%)	2,150 (94.1)	111 (4.9)	2 (0.1)	10 (0.4)	12 (0.5)	2,285 (100.0)	66	403	2,754
165～ (%)	2,233 (95.1)	83 (3.5)	5 (0.2)	15 (0.6)	12 (0.5)	2,348 (100.0)	58	355	2,761
170～ (%)	1,579 (94.9)	66 (4.0)	1 (0.1)	7 (0.4)	11 (0.7)	1,664 (100.0)	36	288	1,988
175～ (%)	645 (97.0)	14 (2.1)	1 (0.2)	3 (0.5)	2 (0.3)	665 (100.0)	10	101	776
180～ (%)	163 (94.2)	10 (5.8)				173 (100.0)	1	21	195
185～ (%)	26 (100.0)					26 (100.0)	2	3	31
190～ (%)	6 (100.0)					6 (100.0)	1		7
合計 (%)	11,476 (94.6)	507 (4.2)	16 (0.1)	63 (0.5)	65 (0.5)	12,127 (100.0)	280	1,943	14,350
記載なし (%)	713 (96.6)	18 (2.4)		5 (0.7)	2 (0.3)	738 (100.0)	24	2,018	2,780
総計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130
平均	161.01	160.22	160.63	159.16	160.57	160.98	161.11	161.07	160.98
標準偏差	10.72	9.58	8.02	10.05	9.97	10.57	8.81	10.24	10.57

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査