

表 1430 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 透析後体重(kg)別（腹膜透析の経験があるか現在施行している患者）

透析後体重	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	41 (100.0)					41 (100.0)		2	43
20～ (%)	47 (94.0)	3 (6.0)				50 (100.0)	1	5	56
30～ (%)	612 (90.0)	53 (7.8)	2 (0.3)	6 (0.9)	7 (1.0)	680 (100.0)	23	56	759
40～ (%)	2,348 (91.9)	156 (6.1)	4 (0.2)	25 (1.0)	22 (0.9)	2,555 (100.0)	69	287	2,911
50～ (%)	3,482 (94.6)	157 (4.3)	7 (0.2)	17 (0.5)	19 (0.5)	3,682 (100.0)	100	422	4,204
60～ (%)	2,811 (95.6)	104 (3.5)	3 (0.1)	13 (0.4)	10 (0.3)	2,941 (100.0)	63	336	3,340
70～ (%)	1,224 (96.9)	28 (2.2)		3 (0.2)	8 (0.6)	1,263 (100.0)	20	131	1,414
80～ (%)	457 (97.9)	8 (1.7)		1 (0.2)	1 (0.2)	467 (100.0)	7	51	525
90～ (%)	160 (98.8)	2 (1.2)				162 (100.0)	3	22	187
100～ (%)	26 (100.0)					26 (100.0)	1	5	32
110～ (%)	12 (92.3)	1 (7.7)				13 (100.0)	1	3	17
120～ (%)	13 (100.0)					13 (100.0)	1		14
合計 (%)	11,233 (94.5)	512 (4.3)	16 (0.1)	65 (0.5)	67 (0.6)	11,893 (100.0)	289	1,320	13,502
記載なし (%)	956 (98.4)	13 (1.3)		3 (0.3)		972 (100.0)	15	2,641	3,628
総計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130
平均	58.15	53.43	51.57	52.47	53.37	57.88	56.45	58.34	57.90
標準偏差	13.40	11.69	9.11	10.54	11.40	13.34	13.35	12.94	13.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査