

表 1432 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 体重減少率(%)別 (腹膜透析の経験があるか現在施行している患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	141 (89.8)	10 (6.4)		5 (3.2)	1 (0.6)	157 (100.0)	7	15	179
1.0～ (%)	226 (93.8)	12 (5.0)		3 (1.2)		241 (100.0)	4	34	279
2.0～ (%)	546 (89.8)	46 (7.6)	5 (0.8)	8 (1.3)	3 (0.5)	608 (100.0)	18	64	690
3.0～ (%)	1,216 (92.1)	81 (6.1)	2 (0.2)	7 (0.5)	15 (1.1)	1,321 (100.0)	45	140	1,506
4.0～ (%)	1,764 (90.5)	144 (7.4)	6 (0.3)	21 (1.1)	14 (0.7)	1,949 (100.0)	64	186	2,199
5.0～ (%)	1,396 (91.8)	96 (6.3)	2 (0.1)	9 (0.6)	17 (1.1)	1,520 (100.0)	60	158	1,738
6.0～ (%)	674 (89.9)	61 (8.1)		6 (0.8)	9 (1.2)	750 (100.0)	25	72	847
7.0～ (%)	243 (91.0)	18 (6.7)	1 (0.4)	1 (0.4)	4 (1.5)	267 (100.0)	9	39	315
8.0～ (%)	74 (81.3)	14 (15.4)		2 (2.2)	1 (1.1)	91 (100.0)	3	12	106
9.0～ (%)	35 (94.6)	1 (2.7)		1 (2.7)		37 (100.0)	1	5	43
合計 (%)	6,315 (91.0)	483 (7.0)	16 (0.2)	63 (0.9)	64 (0.9)	6,941 (100.0)	236	725	7,902
記載なし (%)	107 (93.0)	6 (5.2)		2 (1.7)		115 (100.0)	1	173	289
総計 (%)	6,422 (91.0)	489 (6.9)	16 (0.2)	65 (0.9)	64 (0.9)	7,056 (100.0)	237	898	8,191
平均	4.55	4.68	4.09	4.19	4.85	4.56	4.63	4.58	4.56
標準偏差	1.62	1.66	1.28	2.03	1.48	1.63	1.57	1.69	1.63

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査