

表 1433 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 Body Mass Index別 (腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

Body Mass Index	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
14未満 (%)	64 (97.0)	2 (3.0)				66 (100.0)	1	5	72
14～ (%)	259 (88.7)	27 (9.2)	3 (1.0)	2 (0.7)	1 (0.3)	292 (100.0)	7	23	322
16～ (%)	932 (89.7)	84 (8.1)		11 (1.1)	12 (1.2)	1,039 (100.0)	36	105	1,180
18～ (%)	1,890 (92.7)	114 (5.6)	3 (0.1)	13 (0.6)	18 (0.9)	2,038 (100.0)	52	209	2,299
20～ (%)	2,481 (93.8)	121 (4.6)	8 (0.3)	21 (0.8)	13 (0.5)	2,644 (100.0)	65	270	2,979
22～ (%)	2,161 (95.9)	74 (3.3)	2 (0.1)	7 (0.3)	10 (0.4)	2,254 (100.0)	43	262	2,559
24～ (%)	1,444 (95.9)	48 (3.2)		6 (0.4)	7 (0.5)	1,505 (100.0)	30	137	1,672
26～ (%)	824 (97.9)	13 (1.5)		2 (0.2)	3 (0.4)	842 (100.0)	15	78	935
28～ (%)	441 (98.2)	8 (1.8)				449 (100.0)	12	43	504
30～ (%)	317 (97.2)	7 (2.1)		1 (0.3)	1 (0.3)	326 (100.0)	7	35	368
合計 (%)	10,813 (94.4)	498 (4.3)	16 (0.1)	63 (0.5)	65 (0.6)	11,455 (100.0)	268	1,167	12,890
記載なし (%)	1,376 (97.6)	27 (1.9)		5 (0.4)	2 (0.1)	1,410 (100.0)	36	2,794	4,240
総計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130
平均	22.14	20.61	19.87	20.66	20.72	21.99	21.64	22.07	22.05
標準偏差	3.68	3.37	2.40	3.03	3.02	3.66	3.73	3.54	3.66

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査