

表 1434 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 透析前BUN(mg/dL)別 (腹膜透析の経験があるか現在施行している患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

| 透析前BUN | なし | あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり) | あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし) | あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり) | あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし) | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------|-------|-------|
| 20未満 (%) | 20 (87.0) | 3 (13.0) | | | | 23 (100.0) | | 1 | 24 |
| 20～ (%) | 94 (93.1) | 7 (6.9) | | | | 101 (100.0) | 5 | 12 | 118 |
| 30～ (%) | 289 (91.2) | 21 (6.6) | | | | 317 (100.0) | 12 | 43 | 372 |
| 40～ (%) | 812 (90.9) | 60 (6.7) | 3 (0.3) | 13 (1.3) | 5 (0.9) | 893 (100.0) | 25 | 79 | 997 |
| 50～ (%) | 1,460 (91.6) | 100 (6.3) | 6 (0.4) | 15 (0.9) | 13 (0.8) | 1,594 (100.0) | 61 | 180 | 1,835 |
| 60～ (%) | 1,563 (90.8) | 124 (7.2) | 3 (0.2) | 12 (0.7) | 20 (1.2) | 1,722 (100.0) | 59 | 181 | 1,962 |
| 70～ (%) | 1,243 (91.3) | 97 (7.1) | 2 (0.1) | 10 (0.7) | 10 (0.7) | 1,362 (100.0) | 30 | 144 | 1,536 |
| 80～ (%) | 548 (89.5) | 51 (8.3) | 2 (0.3) | 5 (0.8) | 6 (1.0) | 612 (100.0) | 32 | 61 | 705 |
| 90～ (%) | 217 (93.9) | 8 (3.5) | | 2 (0.9) | 4 (1.7) | 231 (100.0) | 7 | 25 | 263 |
| 100～ (%) | 55 (83.3) | 7 (10.6) | | 1 (1.5) | 3 (4.5) | 66 (100.0) | 5 | 8 | 79 |
| 110～ (%) | 28 (84.8) | 4 (12.1) | | 1 (3.0) | | 33 (100.0) | 1 | 1 | 35 |
| 120～ (%) | 9 (90.0) | 1 (10.0) | | | | 10 (100.0) | | 2 | 12 |
| 合計 (%) | 6,338 (91.0) | 483 (6.9) | 16 (0.2) | 63 (0.9) | 64 (0.9) | 6,964 (100.0) | 237 | 737 | 7,938 |
| 記載なし (%) | 84 (91.3) | 6 (6.5) | | 2 (2.2) | | 92 (100.0) | | 161 | 253 |
| 総計 (%) | 6,422 (91.0) | 489 (6.9) | 16 (0.2) | 65 (0.9) | 64 (0.9) | 7,056 (100.0) | 237 | 898 | 8,191 |
| 平均 | 62.84 | 63.44 | 61.56 | 61.27 | 67.00 | 62.90 | 63.34 | 62.69 | 62.90 |
| 標準偏差 | 15.88 | 16.78 | 14.50 | 16.69 | 16.30 | 15.98 | 16.57 | 16.00 | 15.98 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査