

表 1435 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (腹膜透析の経験があるか現在施行している患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前クレアチニン濃度	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
2未満(%)	1 (100.0)					1 (100.0)			1
2~(%)	39 (95.1)	2 (4.9)				41 (100.0)			1 42
4~(%)	163 (90.6)	14 (7.8)		3 (1.7)		180 (100.0)	7	9	196
6~(%)	538 (89.2)	47 (7.8)	3 (0.5)	13 (2.2)	2 (0.3)	603 (100.0)	23	50	676
8~(%)	1,379 (91.6)	99 (6.6)	4 (0.3)	12 (0.8)	12 (0.8)	1,506 (100.0)	58	168	1,732
10~(%)	1,785 (90.0)	152 (7.7)	7 (0.4)	15 (0.8)	25 (1.3)	1,984 (100.0)	64	241	2,289
12~(%)	1,469 (90.9)	119 (7.4)	1 (0.1)	15 (0.9)	12 (0.7)	1,616 (100.0)	48	187	1,851
14~(%)	720 (93.4)	35 (4.5)	1 (0.1)	5 (0.6)	10 (1.3)	771 (100.0)	26	62	859
16~(%)	243 (93.1)	15 (5.7)			3 (1.1)	261 (100.0)	11	19	291
合計(%)	6,337 (91.0)	483 (6.9)	16 (0.2)	63 (0.9)	64 (0.9)	6,963 (100.0)	237	737	7,937
記載なし(%)	85 (91.4)	6 (6.5)		2 (2.2)		93 (100.0)		161	254
総計(%)	6,422 (91.0)	489 (6.9)	16 (0.2)	65 (0.9)	64 (0.9)	7,056 (100.0)	237	898	8,191
平均	11.14	10.93	10.21	10.25	11.73	11.12	11.01	11.16	11.12
標準偏差	2.78	2.56	1.85	2.73	2.41	2.73	2.74	2.38	2.73

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査