

表 1441 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 透析前CRP濃度(mg/dL)別（腹膜透析の経験があるか現在施行している患者）

透析前CRP濃度	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	5,876 (94.9)	249 (4.0)	4 (0.1)	27 (0.4)	36 (0.6)	6,192 (100.0)	133	785	7,110
0.2～ (%)	1,857 (93.6)	99 (5.0)	4 (0.2)	12 (0.6)	11 (0.6)	1,983 (100.0)	43	240	2,266
0.5～ (%)	867 (94.5)	40 (4.4)	1 (0.1)	6 (0.7)	3 (0.3)	917 (100.0)	26	130	1,073
1.0～ (%)	585 (95.0)	22 (3.6)	2 (0.3)	4 (0.6)	3 (0.5)	616 (100.0)	18	81	715
2.0～ (%)	368 (93.9)	19 (4.8)	1 (0.3)	3 (0.8)	1 (0.3)	392 (100.0)	10	53	455
4.0～ (%)	153 (95.0)	7 (4.3)			1 (0.6)	161 (100.0)	4	14	179
6.0～ (%)	71 (97.3)	2 (2.7)				73 (100.0)	2	12	87
8.0～ (%)	46 (97.9)	1 (2.1)				47 (100.0)	1	4	52
10.0～ (%)	52 (94.5)	1 (1.8)		2 (3.6)		55 (100.0)	1	2	58
15.0～ (%)	28 (93.3)				2 (6.7)	30 (100.0)	1		31
合計 (%)	9,903 (94.6)	440 (4.2)	12 (0.1)	54 (0.5)	57 (0.5)	10,466 (100.0)	239	1,321	12,026
記載なし (%)	2,286 (95.3)	85 (3.5)	4 (0.2)	14 (0.6)	10 (0.4)	2,399 (100.0)	65	2,640	5,104
総計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130
平均	0.65	0.51	0.67	0.94	0.87	0.64	0.73	0.52	0.64
標準偏差	2.16	1.12	0.96	2.33	2.97	2.09	2.00	1.14	2.04

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査