

表 1442 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（腹膜透析の経験があるか現在施行している患者）

透析前補正 カルシウム濃度	なし	あり(剥離手術既往あり、 ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、 ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、 ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、 ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	55 (93.2)	2 (3.4)			2 (3.4)	59 (100.0)		9	68
7.0～ (%)	69 (93.2)	4 (5.4)		1 (1.4)		74 (100.0)	2	8	84
7.5～ (%)	232 (94.3)	8 (3.3)		2 (0.8)	4 (1.6)	246 (100.0)	5	42	293
8.0～ (%)	634 (93.9)	31 (4.6)	3 (0.4)	3 (0.4)	4 (0.6)	675 (100.0)	24	95	794
8.4～ (%)	224 (95.3)	8 (3.4)		2 (0.9)	1 (0.4)	235 (100.0)	7	22	264
8.5～ (%)	2,073 (93.3)	111 (5.0)	4 (0.2)	14 (0.6)	20 (0.9)	2,222 (100.0)	57	269	2,548
9.0～ (%)	3,267 (94.6)	152 (4.4)	3 (0.1)	16 (0.5)	17 (0.5)	3,455 (100.0)	67	411	3,933
9.5～ (%)	2,763 (95.5)	103 (3.6)	4 (0.1)	13 (0.4)	10 (0.3)	2,893 (100.0)	65	363	3,321
10.0～ (%)	362 (94.3)	18 (4.7)		1 (0.3)	3 (0.8)	384 (100.0)	10	49	443
10.1～ (%)	865 (94.2)	44 (4.8)		6 (0.7)	3 (0.3)	918 (100.0)	21	146	1,085
10.5～ (%)	464 (94.1)	24 (4.9)	2 (0.4)	2 (0.4)	1 (0.2)	493 (100.0)	10	76	579
11.0～ (%)	168 (93.9)	6 (3.4)		3 (1.7)	2 (1.1)	179 (100.0)	8	22	209
11.5～ (%)	53 (100.0)					53 (100.0)	2	9	64
12.0～ (%)	44 (95.7)	1 (2.2)		1 (2.2)		46 (100.0)	1	4	51
合計 (%)	11,273 (94.5)	512 (4.3)	16 (0.1)	64 (0.5)	67 (0.6)	11,932 (100.0)	279	1,525	13,736
記載なし (%)	916 (98.2)	13 (1.4)		4 (0.4)		933 (100.0)	25	2,436	3,394
総計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130
平均	9.32	9.28	9.18	9.34	9.04	9.31	9.32	9.34	9.32
標準偏差	0.78	0.75	0.78	0.91	0.86	0.78	0.80	0.81	0.78

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査