

表 1445 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 PTH値(pg/mL)別(腹膜透析の経験があるか現在施行している患者) PTH測定法:whole-PTH

PTH値	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	98 (94.2)	5 (4.8)			1 (1.0)	104 (100.0)	2	2	108
20~ (%)	122 (96.1)	3 (2.4)		1 (0.8)	1 (0.8)	127 (100.0)	4	4	135
35~ (%)	128 (98.5)	2 (1.5)				130 (100.0)	3	2	135
50~ (%)	176 (95.1)	5 (2.7)		3 (1.6)	1 (0.5)	185 (100.0)	1	8	194
75~ (%)	151 (96.2)	4 (2.5)		2 (1.3)		157 (100.0)	1	13	171
100~ (%)	149 (98.0)	3 (2.0)				152 (100.0)	2	5	159
125~ (%)	99 (96.1)	3 (2.9)		1 (1.0)		103 (100.0)	1	7	111
150~ (%)	2 (66.7)	1 (33.3)				3 (100.0)			3
151~ (%)	98 (95.1)	3 (2.9)		1 (1.0)	1 (1.0)	103 (100.0)	1	6	110
180~ (%)	60 (93.8)	2 (3.1)			2 (3.1)	64 (100.0)		3	67
210~ (%)	51 (94.4)	1 (1.9)		1 (1.9)	1 (1.9)	54 (100.0)	1	2	57
240~ (%)	49 (94.2)	1 (1.9)		1 (1.9)	1 (1.9)	52 (100.0)			52
300~ (%)	28 (93.3)	2 (6.7)				30 (100.0)		1	31
350~ (%)	15 (93.8)	1 (6.3)				16 (100.0)			16
400~ (%)	16 (94.1)	1 (5.9)				17 (100.0)			17
500~ (%)	29 (93.5)	1 (3.2)		1 (3.2)		31 (100.0)			31
合計 (%)	1,271 (95.7)	38 (2.9)		11 (0.8)	8 (0.6)	1,328 (100.0)	16	53	1,397
記載なし (%)	5,830 (91.0)	454 (7.1)	16 (0.2)	54 (0.8)	56 (0.9)	6,410 (100.0)	221	880	7,511
総計 (%)	7,101 (91.8)	492 (6.4)	16 (0.2)	65 (0.8)	64 (0.8)	7,738 (100.0)	237	933	8,908
平均	126.75	141.42		161.82	143.25	126.13	70.50	107.57	126.15
標準偏差	154.57	152.82		162.24	96.77	151.33	61.15	60.31	151.11

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査