

表 1446 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別（腹膜透析の経験があるか現在施行している患者）

透析前ヘモグロビン濃度	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
5未満 (%)	13 (92.9)	1 (7.1)				14 (100.0)		1	15
5～ (%)	14 (100.0)					14 (100.0)	1	5	20
6～ (%)	45 (100.0)					45 (100.0)	1	7	53
7～ (%)	176 (95.7)	6 (3.3)		2 (1.1)		184 (100.0)	9	34	227
8～ (%)	545 (93.5)	31 (5.3)		2 (0.3)	5 (0.9)	583 (100.0)	16	101	700
9～ (%)	1,721 (94.6)	76 (4.2)	2 (0.1)	12 (0.7)	9 (0.5)	1,820 (100.0)	57	212	2,089
10～ (%)	3,369 (93.6)	182 (5.1)	9 (0.3)	18 (0.5)	21 (0.6)	3,599 (100.0)	81	469	4,149
11～ (%)	3,425 (94.8)	145 (4.0)	4 (0.1)	21 (0.6)	17 (0.5)	3,612 (100.0)	74	421	4,107
12～ (%)	1,457 (95.7)	47 (3.1)	1 (0.1)	8 (0.5)	10 (0.7)	1,523 (100.0)	35	203	1,761
13～ (%)	422 (94.4)	19 (4.3)		3 (0.7)	3 (0.7)	447 (100.0)	8	66	521
14～ (%)	154 (94.5)	7 (4.3)			2 (1.2)	163 (100.0)	4	20	187
合計 (%)	11,341 (94.5)	514 (4.3)	16 (0.1)	66 (0.5)	67 (0.6)	12,004 (100.0)	286	1,539	13,829
記載なし (%)	848 (98.5)	11 (1.3)		2 (0.2)		861 (100.0)	18	2,422	3,301
総計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130
平均	10.86	10.77	10.69	10.80	10.99	10.85	10.68	10.80	10.84
標準偏差	1.35	1.32	0.85	1.23	1.31	1.35	1.41	1.41	1.36

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査