

表 1447 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 総コレステロール濃度(mg/dL)別（腹膜透析の経験があるか現在施行している患者）

総コレステロール濃度	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	212 (94.2)	9 (4.0)	2 (0.9)	1 (0.4)	1 (0.4)	225 (100.0)	4	36	265
100～ (%)	579 (93.5)	35 (5.7)		3 (0.5)	2 (0.3)	619 (100.0)	25	96	740
120～ (%)	1,377 (93.7)	73 (5.0)	2 (0.1)	7 (0.5)	10 (0.7)	1,469 (100.0)	28	183	1,680
140～ (%)	1,804 (94.6)	74 (3.9)	3 (0.2)	13 (0.7)	12 (0.6)	1,906 (100.0)	49	264	2,219
160～ (%)	1,700 (93.9)	82 (4.5)	2 (0.1)	12 (0.7)	15 (0.8)	1,811 (100.0)	44	229	2,084
180～ (%)	1,338 (94.2)	66 (4.6)		7 (0.5)	9 (0.6)	1,420 (100.0)	45	177	1,642
200～ (%)	829 (94.4)	33 (3.8)	3 (0.3)	5 (0.6)	8 (0.9)	878 (100.0)	23	123	1,024
220～ (%)	414 (95.4)	13 (3.0)		2 (0.5)	5 (1.2)	434 (100.0)	4	49	487
240～ (%)	188 (94.9)	8 (4.0)		2 (1.0)		198 (100.0)	5	33	236
260～ (%)	150 (96.2)	4 (2.6)		2 (1.3)		156 (100.0)	4	27	187
合計 (%)	8,591 (94.2)	397 (4.4)	12 (0.1)	54 (0.6)	62 (0.7)	9,116 (100.0)	231	1,217	10,564
記載なし (%)	3,598 (96.0)	128 (3.4)	4 (0.1)	14 (0.4)	5 (0.1)	3,749 (100.0)	73	2,744	6,566
総計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130
平均	166.51	162.61	152.17	170.19	168.02	165.59	165.06	166.15	166.30
標準偏差	38.85	36.62	44.70	40.75	34.74	38.68	38.13	40.55	38.95

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査