

表 1448 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 HDL-C濃度(mg/dL)別 (腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

HDL-C濃度	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	22 (95.7)	1 (4.3)				23 (100.0)	1	4	28
20～ (%)	556 (95.9)	19 (3.3)		2 (0.3)	3 (0.5)	580 (100.0)	14	84	678
30～ (%)	1,725 (95.3)	72 (4.0)		5 (0.3)	9 (0.5)	1,811 (100.0)	48	259	2,118
40～ (%)	2,019 (94.9)	87 (4.1)	3 (0.1)	9 (0.4)	10 (0.5)	2,128 (100.0)	43	294	2,465
50～ (%)	1,627 (94.2)	71 (4.1)	2 (0.1)	15 (0.9)	13 (0.8)	1,728 (100.0)	48	224	2,000
60～ (%)	1,045 (93.0)	58 (5.2)	3 (0.3)	7 (0.6)	11 (1.0)	1,124 (100.0)	27	133	1,284
70～ (%)	512 (93.3)	26 (4.7)	2 (0.4)	5 (0.9)	4 (0.7)	549 (100.0)	12	71	632
80～ (%)	261 (92.2)	18 (6.4)	1 (0.4)	1 (0.4)	2 (0.7)	283 (100.0)	6	41	330
90～ (%)	107 (91.5)	9 (7.7)			1 (0.9)	117 (100.0)	3	17	137
100～ (%)	108 (94.7)	4 (3.5)		2 (1.8)		114 (100.0)	3	7	124
合計 (%)	7,982 (94.4)	365 (4.3)	11 (0.1)	46 (0.5)	53 (0.6)	8,457 (100.0)	205	1,134	9,796
記載なし (%)	4,207 (95.4)	160 (3.6)	5 (0.1)	22 (0.5)	14 (0.3)	4,408 (100.0)	99	2,827	7,334
総計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130
平均	50.41	52.55	60.00	56.39	53.11	50.49	50.66	49.53	50.45
標準偏差	17.37	17.68	12.86	17.39	15.95	17.36	18.31	16.53	17.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査