

表 1449 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別(腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

Non-HDL-C濃度	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	87 (92.6)	5 (5.3)	1 (1.1)		1 (1.1)	94 (100.0)	4	18	116
50～ (%)	449 (93.9)	20 (4.2)	2 (0.4)	5 (1.0)	2 (0.4)	478 (100.0)	14	69	561
70～ (%)	1,134 (92.6)	73 (6.0)	1 (0.1)	7 (0.6)	9 (0.7)	1,224 (100.0)	42	158	1,424
90～ (%)	1,578 (94.0)	82 (4.9)	2 (0.1)	9 (0.5)	8 (0.5)	1,679 (100.0)	39	208	1,926
110～ (%)	1,486 (93.8)	72 (4.5)	2 (0.1)	12 (0.8)	13 (0.8)	1,585 (100.0)	29	226	1,840
130～ (%)	1,045 (95.2)	40 (3.6)	1 (0.1)	1 (0.1)	11 (1.0)	1,098 (100.0)	29	141	1,268
150～ (%)	613 (94.7)	22 (3.4)	1 (0.2)	4 (0.6)	7 (1.1)	647 (100.0)	16	100	763
170～ (%)	332 (96.5)	8 (2.3)		3 (0.9)	1 (0.3)	344 (100.0)	6	45	395
190～ (%)	135 (94.4)	7 (4.9)		1 (0.7)		143 (100.0)	4	14	161
210～ (%)	86 (97.7)	1 (1.1)		1 (1.1)		88 (100.0)	2	23	113
合計 (%)	6,945 (94.1)	330 (4.5)	10 (0.1)	43 (0.6)	52 (0.7)	7,380 (100.0)	185	1,002	8,567
記載なし (%)	5,244 (95.6)	195 (3.6)	6 (0.1)	25 (0.5)	15 (0.3)	5,485 (100.0)	119	2,959	8,563
総計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130
平均	115.92	109.42	98.00	114.65	116.52	114.90	112.66	117.01	115.71
標準偏差	36.23	32.05	40.12	39.70	31.39	36.01	37.45	38.07	36.34

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査