

表 1450 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 透析前収縮期血圧(mmHg)別 (腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

| 透析前収縮期血圧 | なし | あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり) | あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし) | あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり) | あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし) | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|-------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 60未満 (%) | 2 (100.0) | | | | | 2 (100.0) | | 2 | 4 |
| 60～ (%) | 23 (100.0) | | | | | 23 (100.0) | 1 | 1 | 25 |
| 80～ (%) | 187 (90.8) | 17 (8.3) | | 2 (1.0) | | 206 (100.0) | 4 | 23 | 233 |
| 100～ (%) | 951 (95.1) | 32 (3.2) | 4 (0.4) | 5 (0.5) | 8 (0.8) | 1,000 (100.0) | 23 | 137 | 1,160 |
| 120～ (%) | 2,693 (95.1) | 101 (3.6) | 3 (0.1) | 18 (0.6) | 16 (0.6) | 2,831 (100.0) | 65 | 287 | 3,183 |
| 140～ (%) | 3,464 (94.7) | 151 (4.1) | 3 (0.1) | 19 (0.5) | 21 (0.6) | 3,658 (100.0) | 68 | 377 | 4,103 |
| 160～ (%) | 1,867 (93.5) | 102 (5.1) | 2 (0.1) | 13 (0.7) | 13 (0.7) | 1,997 (100.0) | 52 | 257 | 2,306 |
| 180～ (%) | 657 (93.9) | 39 (5.6) | | 3 (0.4) | 1 (0.1) | 700 (100.0) | 20 | 78 | 798 |
| 200～ (%) | 134 (93.7) | 4 (2.8) | | 1 (0.7) | 4 (2.8) | 143 (100.0) | 6 | 13 | 162 |
| 220～ (%) | 35 (94.6) | 1 (2.7) | | 1 (2.7) | | 37 (100.0) | 1 | 6 | 44 |
| 合計 (%) | 10,013 (94.5) | 447 (4.2) | 12 (0.1) | 62 (0.6) | 63 (0.6) | 10,597 (100.0) | 240 | 1,181 | 12,018 |
| 記載なし (%) | 2,176 (95.9) | 78 (3.4) | 4 (0.2) | 6 (0.3) | 4 (0.2) | 2,268 (100.0) | 64 | 2,780 | 5,112 |
| 総計 (%) | 12,189 (94.7) | 525 (4.1) | 16 (0.1) | 68 (0.5) | 67 (0.5) | 12,865 (100.0) | 304 | 3,961 | 17,130 |
| 平均 | 146.07 | 148.41 | 135.42 | 146.18 | 147.52 | 146.44 | 147.95 | 146.59 | 146.25 |
| 標準偏差 | 23.61 | 24.28 | 19.94 | 24.90 | 25.49 | 23.75 | 25.74 | 24.65 | 23.80 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査