

表 1451 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 透析前拡張期血圧(mmHg)別 (腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

透析前拡張期血圧	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	2 (66.7)	1 (33.3)				3 (100.0)			3
20～ (%)	39 (97.5)	1 (2.5)				40 (100.0)		3	43
40～ (%)	697 (94.2)	33 (4.5)	2 (0.3)	4 (0.5)	4 (0.5)	740 (100.0)	29	94	863
60～ (%)	4,232 (94.4)	196 (4.4)	4 (0.1)	31 (0.7)	22 (0.5)	4,485 (100.0)	104	484	5,073
80～ (%)	2,640 (94.4)	115 (4.1)	3 (0.1)	13 (0.5)	25 (0.9)	2,796 (100.0)	56	321	3,173
90～ (%)	1,548 (94.7)	70 (4.3)	1 (0.1)	9 (0.6)	7 (0.4)	1,635 (100.0)	31	170	1,836
100～ (%)	775 (95.2)	29 (3.6)	2 (0.2)	3 (0.4)	5 (0.6)	814 (100.0)	18	105	937
120～ (%)	43 (95.6)	1 (2.2)		1 (2.2)		45 (100.0)	2	5	52
140～ (%)	1 (50.0)	1 (50.0)				2 (100.0)			2
合計 (%)	9,977 (94.5)	447 (4.2)	12 (0.1)	61 (0.6)	63 (0.6)	10,560 (100.0)	240	1,182	11,982
記載なし (%)	2,212 (96.0)	78 (3.4)	4 (0.2)	7 (0.3)	4 (0.2)	2,305 (100.0)	64	2,779	5,148
総計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130
平均	79.46	78.80	79.33	78.46	80.94	79.43	78.02	79.63	79.43
標準偏差	14.48	14.58	15.65	15.36	13.48	14.51	15.88	14.55	14.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査