

表 1454 降圧薬使用の有無 治療方法(新分類)別(透析患者全体)

治療方法 (新分類)	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析	65,692	137,718	203,410	967	51,264	255,641
(%)	(32.3)	(67.7)	(100.0)			
Off-line HDF	2,047	3,049	5,096	21	1,198	6,315
(%)	(40.2)	(59.8)	(100.0)			
On-line HDF	9,738	19,619	29,357	70	6,663	36,090
(%)	(33.2)	(66.8)	(100.0)			
Push/Pull HDF	104	269	373	8	156	537
(%)	(27.9)	(72.1)	(100.0)			
ハイオフィルトレーション	131	178	309		32	341
(%)	(42.4)	(57.6)	(100.0)			
血液濾過	7	56	63	1	28	92
(%)	(11.1)	(88.9)	(100.0)			
血液吸着透析 (リクセル)	705	655	1,360	2	261	1,623
(%)	(51.8)	(48.2)	(100.0)			
血液吸着透析 (その他)		5	5		2	7
(%)		(100.0)	(100.0)			
在宅血液透析	177	194	371	2	148	521
(%)	(47.7)	(52.3)	(100.0)			
腹膜透析 (CAPD)	739	2,634	3,373	36	1,612	5,021
(%)	(21.9)	(78.1)	(100.0)			
腹膜透析 (APD)	402	1,580	1,982	25	832	2,839
(%)	(20.3)	(79.7)	(100.0)			
腹膜透析 (CCPD)	146	678	824	10	247	1,081
(%)	(17.7)	(82.3)	(100.0)			
合計	79,888	166,635	246,523	1,142	62,443	310,108
(%)	(32.4)	(67.6)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	79,888	166,635	246,523	1,142	62,443	310,108
(%)	(32.4)	(67.6)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査