

表 1455 降圧薬使用の有無 併用の状況別（透析患者全体）

併用の状況	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独	78,533 (%)	161,531 (67.3)	240,064 (100.0)	1,063	59,667	300,794
PD単独	1,012 (%)	3,864 (79.2)	4,876 (100.0)	51	2,261	7,188
HD(F)単独.PDカテあり	49 (%)	155 (76.0)	204 (100.0)		65	269
PD.HD併用週1	221 (%)	912 (80.5)	1,133 (100.0)	19	392	1,544
PD.HD併用週2	51 (%)	99 (66.0)	150 (100.0)	1	26	177
PD.HD併用週3	8 (%)	23 (74.2)	31 (100.0)		9	40
PD.HD併用週4		1 (100.0)	1 (100.0)			1
PD.HD併用その他	12 (%)	46 (79.3)	58 (100.0)		15	73
合計	79,886 (%)	166,631 (67.6)	246,517 (100.0)	1,134	62,435	310,086
不明	2 (%)	4 (66.7)	6 (100.0)	8	8	22
記載なし						
総計	79,888 (%)	166,635 (67.6)	246,523 (100.0)	1,142	62,443	310,108

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査