

表 1457 降圧薬使用の有無 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	31 (43.1)	41 (56.9)	72 (100.0)		45	117
15歳～ (%)	268 (32.5)	556 (67.5)	824 (100.0)	5	208	1,037
30歳～ (%)	3,642 (31.6)	7,888 (68.4)	11,530 (100.0)	53	2,802	14,385
45歳～ (%)	13,513 (29.9)	31,645 (70.1)	45,158 (100.0)	197	11,213	56,568
60歳～ (%)	34,776 (30.8)	78,126 (69.2)	112,902 (100.0)	537	28,539	141,978
75歳～ (%)	25,838 (35.9)	46,212 (64.1)	72,050 (100.0)	334	18,613	90,997
90歳～ (%)	1,819 (45.7)	2,159 (54.3)	3,978 (100.0)	16	1,011	5,005
合計 (%)	79,887 (32.4)	166,627 (67.6)	246,514 (100.0)	1,142	62,431	310,087
不明 (%)	1 (11.1)	8 (88.9)	9 (100.0)		12	21
記載なし (%)						
総計 (%)	79,888 (32.4)	166,635 (67.6)	246,523 (100.0)	1,142	62,443	310,108
平均	68.41	67.05	67.49	67.60	67.73	67.54
標準偏差	12.80	12.31	12.49	12.50	12.50	12.49

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査