

表 1458 降圧薬使用の有無 透析歴(年)別 (透析患者全体)

透析歴	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	15,540 (28.7)	38,555 (71.3)	54,095 (100.0)	303	13,744	68,142
2年～ (%)	18,494 (30.1)	42,982 (69.9)	61,476 (100.0)	282	16,185	77,943
5年～ (%)	19,009 (30.6)	43,119 (69.4)	62,128 (100.0)	275	15,459	77,862
10年～ (%)	10,627 (33.2)	21,338 (66.8)	31,965 (100.0)	124	7,943	40,032
15年～ (%)	6,479 (38.4)	10,409 (61.6)	16,888 (100.0)	67	4,258	21,213
20年～ (%)	4,105 (43.2)	5,403 (56.8)	9,508 (100.0)	32	2,262	11,802
25年～ (%)	2,577 (49.3)	2,655 (50.7)	5,232 (100.0)	27	1,292	6,551
30年～ (%)	1,738 (54.8)	1,435 (45.2)	3,173 (100.0)	21	766	3,960
35年～ (%)	1,050 (62.8)	621 (37.2)	1,671 (100.0)	6	389	2,066
40年～ (%)	258 (72.7)	97 (27.3)	355 (100.0)	4	92	451
合計 (%)	79,877 (32.4)	166,614 (67.6)	246,491 (100.0)	1,141	62,390	310,022
不明 (%)	11 (34.4)	21 (65.6)	32 (100.0)	1	53	86
記載なし (%)						
総計 (%)	79,888 (32.4)	166,635 (67.6)	246,523 (100.0)	1,142	62,443	310,108
平均	8.60	6.71	7.32	6.86	7.19	7.29
標準偏差	8.63	6.82	7.51	7.78	7.42	7.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査