

表 1464 降圧薬使用の有無 週透析回数(回/週)別 (透析患者全体)

週透析回数	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
1回 (%)	391 (24.7)	1,193 (75.3)	1,584 (100.0)	22	234	1,840
2回 (%)	1,502 (28.5)	3,776 (71.5)	5,278 (100.0)	29	885	6,192
3回 (%)	75,849 (32.7)	156,005 (67.3)	231,854 (100.0)	1,023	37,762	270,639
4回 (%)	385 (43.0)	510 (57.0)	895 (100.0)	6	93	994
5回 (%)	39 (48.8)	41 (51.3)	80 (100.0)		9	89
6回 (%)	31 (57.4)	23 (42.6)	54 (100.0)	4	23	81
7回 (%)	17 (58.6)	12 (41.4)	29 (100.0)		1	30
合計 (%)	78,214 (32.6)	161,560 (67.4)	239,774 (100.0)	1,084	39,007	279,865
記載なし (%)	1,674 (24.8)	5,075 (75.2)	6,749 (100.0)	58	23,436	30,243
総計 (%)	79,888 (32.4)	166,635 (67.6)	246,523 (100.0)	1,142	62,443	310,108
平均	2.98	2.97	2.97	2.95	2.97	2.97
標準偏差	0.23	0.24	0.24	0.38	0.23	0.24

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査