

表 1468 降圧薬使用の有無 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（透析患者全体）

透析前アルブミン 濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	96 (60.4)	63 (39.6)	159 (100.0)	2	24	185
1.5～ (%)	454 (53.5)	394 (46.5)	848 (100.0)	10	131	989
2.0～ (%)	1,713 (48.8)	1,796 (51.2)	3,509 (100.0)	23	529	4,061
2.5～ (%)	5,688 (42.8)	7,596 (57.2)	13,284 (100.0)	105	2,047	15,436
3.0～ (%)	21,123 (36.9)	36,112 (63.1)	57,235 (100.0)	286	8,587	66,108
3.5～ (%)	36,409 (31.0)	81,090 (69.0)	117,499 (100.0)	451	17,285	135,235
4.0～ (%)	11,428 (26.1)	32,396 (73.9)	43,824 (100.0)	143	6,541	50,508
4.5～ (%)	584 (23.1)	1,946 (76.9)	2,530 (100.0)	4	380	2,914
5.0～ (%)	54 (32.0)	115 (68.0)	169 (100.0)		34	203
合計 (%)	77,549 (32.4)	161,508 (67.6)	239,057 (100.0)	1,024	35,558	275,639
記載なし (%)	2,339 (31.3)	5,127 (68.7)	7,466 (100.0)	118	26,885	34,469
総計 (%)	79,888 (32.4)	166,635 (67.6)	246,523 (100.0)	1,142	62,443	310,108
平均	3.52	3.63	3.60	3.47	3.60	3.60
標準偏差	0.47	0.43	0.44	0.49	0.45	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査