

表 1469 降圧薬使用の有無 透析前CRP濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

透析前CRP濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	34,539 (29.2)	83,567 (70.8)	118,106 (100.0)	524	16,679	135,309
0.2～ (%)	13,286 (33.9)	25,872 (66.1)	39,158 (100.0)	191	5,458	44,807
0.5～ (%)	7,152 (36.2)	12,582 (63.8)	19,734 (100.0)	95	2,928	22,757
1.0～ (%)	4,827 (37.6)	8,018 (62.4)	12,845 (100.0)	76	1,827	14,748
2.0～ (%)	3,119 (40.1)	4,663 (59.9)	7,782 (100.0)	43	1,180	9,005
4.0～ (%)	1,141 (40.8)	1,659 (59.3)	2,800 (100.0)	29	415	3,244
6.0～ (%)	570 (41.8)	794 (58.2)	1,364 (100.0)	9	203	1,576
8.0～ (%)	314 (42.9)	418 (57.1)	732 (100.0)	8	130	870
10.0～ (%)	395 (43.9)	505 (56.1)	900 (100.0)	6	128	1,034
15.0～ (%)	234 (39.9)	352 (60.1)	586 (100.0)	10	97	693
合計 (%)	65,577 (32.1)	138,430 (67.9)	204,007 (100.0)	991	29,045	234,043
記載なし (%)	14,311 (33.7)	28,205 (66.3)	42,516 (100.0)	151	33,398	76,065
総計 (%)	79,888 (32.4)	166,635 (67.6)	246,523 (100.0)	1,142	62,443	310,108
平均	0.76	0.57	0.63	0.94	0.65	0.63
標準偏差	2.12	1.82	1.93	2.63	1.86	1.92

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査