

表 1470 降圧薬使用の有無 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

透析前補正 カルシウム濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	349 (37.0)	594 (63.0)	943 (100.0)	4	195	1,142
7.0～ (%)	502 (35.2)	924 (64.8)	1,426 (100.0)	1	222	1,649
7.5～ (%)	1,667 (30.4)	3,814 (69.6)	5,481 (100.0)	16	902	6,399
8.0～ (%)	5,350 (30.5)	12,211 (69.5)	17,561 (100.0)	70	2,808	20,439
8.4～ (%)	1,474 (29.0)	3,616 (71.0)	5,090 (100.0)	23	759	5,872
8.5～ (%)	18,070 (31.0)	40,177 (69.0)	58,247 (100.0)	243	8,829	67,319
9.0～ (%)	23,134 (32.4)	48,374 (67.6)	71,508 (100.0)	324	10,172	82,004
9.5～ (%)	15,472 (32.9)	31,502 (67.1)	46,974 (100.0)	179	6,816	53,969
10.0～ (%)	1,981 (34.3)	3,792 (65.7)	5,773 (100.0)	21	804	6,598
10.1～ (%)	5,198 (35.2)	9,565 (64.8)	14,763 (100.0)	66	2,148	16,977
10.5～ (%)	2,652 (37.1)	4,503 (62.9)	7,155 (100.0)	42	1,073	8,270
11.0～ (%)	955 (39.9)	1,441 (60.1)	2,396 (100.0)	20	365	2,781
11.5～ (%)	341 (41.1)	489 (58.9)	830 (100.0)	9	134	973
12.0～ (%)	276 (47.1)	310 (52.9)	586 (100.0)	3	92	681
合計 (%)	77,421 (32.4)	161,312 (67.6)	238,733 (100.0)	1,021	35,319	275,073
記載なし (%)	2,467 (31.7)	5,323 (68.3)	7,790 (100.0)	121	27,124	35,035
総計 (%)	79,888 (32.4)	166,635 (67.6)	246,523 (100.0)	1,142	62,443	310,108
平均	9.23	9.17	9.19	9.26	9.17	9.19
標準偏差	0.77	0.73	0.74	0.78	0.77	0.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査