

表 1471 降圧薬使用の有無 透析前リン濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

透析前リン濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	3,894 (41.7)	5,453 (58.3)	9,347 (100.0)	45	1,494	10,886
3.0～ (%)	4,213 (36.0)	7,474 (64.0)	11,687 (100.0)	46	1,849	13,582
3.5～ (%)	6,917 (33.6)	13,650 (66.4)	20,567 (100.0)	93	3,022	23,682
4.0～ (%)	10,049 (32.8)	20,555 (67.2)	30,604 (100.0)	137	4,541	35,282
4.5～ (%)	11,744 (32.1)	24,830 (67.9)	36,574 (100.0)	138	5,347	42,059
5.0～ (%)	11,564 (31.3)	25,440 (68.7)	37,004 (100.0)	141	5,573	42,718
5.5～ (%)	10,124 (31.7)	21,790 (68.3)	31,914 (100.0)	121	4,670	36,705
6.0～ (%)	1,758 (32.2)	3,701 (67.8)	5,459 (100.0)	11	791	6,261
6.1～ (%)	5,573 (30.6)	12,632 (69.4)	18,205 (100.0)	80	2,824	21,109
6.5～ (%)	4,833 (30.6)	10,976 (69.4)	15,809 (100.0)	80	2,389	18,278
7.0～ (%)	2,964 (30.4)	6,781 (69.6)	9,745 (100.0)	44	1,488	11,277
7.5～ (%)	1,842 (30.9)	4,125 (69.1)	5,967 (100.0)	28	863	6,858
8.0～ (%)	1,086 (30.6)	2,461 (69.4)	3,547 (100.0)	18	488	4,053
8.5～ (%)	717 (32.6)	1,482 (67.4)	2,199 (100.0)	15	358	2,572
9.0～ (%)	1,110 (31.5)	2,411 (68.5)	3,521 (100.0)	21	535	4,077
合計 (%)	78,388 (32.4)	163,761 (67.6)	242,149 (100.0)	1,018	36,232	279,399
記載なし (%)	1,500 (34.3)	2,874 (65.7)	4,374 (100.0)	124	26,211	30,709
総計 (%)	79,888 (32.4)	166,635 (67.6)	246,523 (100.0)	1,142	62,443	310,108
平均	5.14	5.25	5.21	5.28	5.21	5.21
標準偏差	1.45	1.41	1.42	1.56	1.44	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査