

表 1472 降圧薬使用の有無 PTH値(pg/mL)別（透析患者全体）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	3,732 (35.8)	6,697 (64.2)	10,429 (100.0)	33	1,411	11,873
20～ (%)	4,920 (33.0)	9,998 (67.0)	14,918 (100.0)	39	1,989	16,946
40～ (%)	5,081 (32.2)	10,705 (67.8)	15,786 (100.0)	58	2,172	18,016
60～ (%)	5,421 (32.0)	11,512 (68.0)	16,933 (100.0)	72	2,225	19,230
80～ (%)	5,376 (31.4)	11,770 (68.6)	17,146 (100.0)	83	2,384	19,613
100～ (%)	5,352 (32.1)	11,341 (67.9)	16,693 (100.0)	73	2,392	19,158
120～ (%)	5,014 (31.7)	10,798 (68.3)	15,812 (100.0)	80	2,330	18,222
140～ (%)	4,504 (30.9)	10,070 (69.1)	14,574 (100.0)	64	2,169	16,807
160～ (%)	4,104 (31.2)	9,067 (68.8)	13,171 (100.0)	59	1,943	15,173
180～ (%)	9,466 (31.8)	20,325 (68.2)	29,791 (100.0)	112	4,610	34,513
240～ (%)	124 (32.3)	260 (67.7)	384 (100.0)	1	59	444
241～ (%)	5,414 (31.6)	11,719 (68.4)	17,133 (100.0)	62	2,644	19,839
300～ (%)	3,188 (31.9)	6,802 (68.1)	9,990 (100.0)	39	1,497	11,526
360～ (%)	1,918 (33.1)	3,885 (66.9)	5,803 (100.0)	17	864	6,684
420～ (%)	1,203 (35.5)	2,190 (64.5)	3,393 (100.0)	9	523	3,925
480～ (%)	296 (35.2)	546 (64.8)	842 (100.0)	6	116	964
500～ (%)	468 (34.6)	884 (65.4)	1,352 (100.0)	6	206	1,564
540～ (%)	534 (36.1)	944 (63.9)	1,478 (100.0)	4	232	1,714
600～ (%)	893 (36.6)	1,545 (63.4)	2,438 (100.0)	7	354	2,799
800～ (%)	787 (41.2)	1,122 (58.8)	1,909 (100.0)	7	246	2,162
合計 (%)	67,795 (32.3)	142,180 (67.7)	209,975 (100.0)	831	30,366	241,172
記載なし (%)	1,527 (34.3)	2,920 (65.7)	4,447 (100.0)	31	1,906	6,384
総計 (%)	69,322 (32.3)	145,100 (67.7)	214,422 (100.0)	862	32,272	247,556
平均	175.77	169.90	171.80	165.77	174.98	172.17
標準偏差	181.58	156.21	164.85	138.40	158.14	163.94

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査