

表 1475 降圧薬使用の有無 総コレステロール濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

総コレステロール濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	2,298 (34.0)	4,467 (66.0)	6,765 (100.0)	37	1,028	7,830
100～ (%)	6,066 (30.8)	13,648 (69.2)	19,714 (100.0)	91	2,917	22,722
120～ (%)	11,351 (31.0)	25,251 (69.0)	36,602 (100.0)	166	5,433	42,201
140～ (%)	13,069 (31.0)	29,139 (69.0)	42,208 (100.0)	183	6,268	48,659
160～ (%)	11,156 (31.9)	23,806 (68.1)	34,962 (100.0)	150	5,131	40,243
180～ (%)	7,339 (33.1)	14,822 (66.9)	22,161 (100.0)	58	3,306	25,525
200～ (%)	4,093 (34.3)	7,834 (65.7)	11,927 (100.0)	40	1,756	13,723
220～ (%)	1,845 (35.2)	3,394 (64.8)	5,239 (100.0)	19	813	6,071
240～ (%)	701 (33.4)	1,396 (66.6)	2,097 (100.0)	8	295	2,400
260～ (%)	481 (36.0)	854 (64.0)	1,335 (100.0)	6	245	1,586
合計 (%)	58,399 (31.9)	124,611 (68.1)	183,010 (100.0)	758	27,192	210,960
記載なし (%)	21,489 (33.8)	42,024 (66.2)	63,513 (100.0)	384	35,251	99,148
総計 (%)	79,888 (32.4)	166,635 (67.6)	246,523 (100.0)	1,142	62,443	310,108
平均	156.82	155.39	155.84	151.73	156.08	155.86
標準偏差	36.41	35.28	35.65	35.44	36.30	35.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査