

表 1482 降圧薬使用の有無 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	2 (20.0)	8 (80.0)	10 (100.0)		2	12
15歳～ (%)	187 (32.9)	381 (67.1)	568 (100.0)	2	87	657
30歳～ (%)	2,693 (31.9)	5,762 (68.1)	8,455 (100.0)	40	1,307	9,802
45歳～ (%)	10,110 (29.7)	23,874 (70.3)	33,984 (100.0)	152	5,449	39,585
60歳～ (%)	27,106 (30.4)	62,185 (69.6)	89,291 (100.0)	441	14,646	104,378
75歳～ (%)	21,714 (36.0)	38,609 (64.0)	60,323 (100.0)	275	10,034	70,632
90歳～ (%)	1,553 (46.2)	1,810 (53.8)	3,363 (100.0)	13	513	3,889
合計 (%)	63,365 (32.3)	132,629 (67.7)	195,994 (100.0)	923	32,038	228,955
不明 (%)	1 (12.5)	7 (87.5)	8 (100.0)		8	16
記載なし (%)						
総計 (%)	63,366 (32.3)	132,636 (67.7)	196,002 (100.0)	923	32,046	228,971
平均	69.05	67.58	68.05	68.07	68.28	68.08
標準偏差	12.66	12.16	12.34	12.14	12.21	12.32

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査