

表 1483 降圧薬使用の有無 透析歴(年)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析歴	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	12,836	30,946	43,782	244	6,689	50,715
(%)	(29.3)	(70.7)	(100.0)			
2年～	15,179	34,462	49,641	226	8,422	58,289
(%)	(30.6)	(69.4)	(100.0)			
5年～	15,579	35,141	50,720	229	8,278	59,227
(%)	(30.7)	(69.3)	(100.0)			
10年～	8,523	17,140	25,663	98	4,271	30,032
(%)	(33.2)	(66.8)	(100.0)			
15年～	4,956	8,021	12,977	55	2,217	15,249
(%)	(38.2)	(61.8)	(100.0)			
20年～	2,928	3,914	6,842	28	1,061	7,931
(%)	(42.8)	(57.2)	(100.0)			
25年～	1,671	1,763	3,434	20	590	4,044
(%)	(48.7)	(51.3)	(100.0)			
30年～	1,001	854	1,855	15	313	2,183
(%)	(54.0)	(46.0)	(100.0)			
35年～	551	332	883	4	146	1,033
(%)	(62.4)	(37.6)	(100.0)			
40年～	136	48	184	3	34	221
(%)	(73.9)	(26.1)	(100.0)			
合計	63,360	132,621	195,981	922	32,021	228,924
(%)	(32.3)	(67.7)	(100.0)			
不明	6	15	21	1	25	47
(%)	(28.6)	(71.4)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	63,366	132,636	196,002	923	32,046	228,971
(%)	(32.3)	(67.7)	(100.0)			
平均	7.97	6.48	6.96	6.77	7.07	6.98
標準偏差	7.99	6.47	7.03	7.58	7.04	7.04

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査