

表 1490 降圧薬使用の有無 血流量(ml/分)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

血流量	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	23 (54.8)	19 (45.2)	42 (100.0)		2	44
100～ (%)	276 (43.7)	356 (56.3)	632 (100.0)	4	103	739
120～ (%)	807 (42.5)	1,091 (57.5)	1,898 (100.0)	20	230	2,148
140～ (%)	6,148 (39.2)	9,555 (60.8)	15,703 (100.0)	110	2,160	17,973
160～ (%)	1,981 (37.7)	3,280 (62.3)	5,261 (100.0)	24	616	5,901
180～ (%)	9,218 (34.8)	17,267 (65.2)	26,485 (100.0)	165	3,835	30,485
200～ (%)	28,071 (32.2)	59,178 (67.8)	87,249 (100.0)	395	12,846	100,490
220～ (%)	7,162 (28.4)	18,050 (71.6)	25,212 (100.0)	110	4,224	29,546
240～ (%)	6,756 (28.8)	16,724 (71.2)	23,480 (100.0)	70	3,510	27,060
260～ (%)	648 (29.8)	1,529 (70.2)	2,177 (100.0)	12	344	2,533
280～ (%)	567 (27.8)	1,471 (72.2)	2,038 (100.0)	3	296	2,337
300～ (%)	1,053 (27.8)	2,729 (72.2)	3,782 (100.0)	5	478	4,265
350～ (%)	129 (33.4)	257 (66.6)	386 (100.0)		43	429
400～ (%)	175 (29.2)	425 (70.8)	600 (100.0)		118	718
合計 (%)	63,014 (32.3)	131,931 (67.7)	194,945 (100.0)	918	28,805	224,668
記載なし (%)	352 (33.3)	705 (66.7)	1,057 (100.0)	5	3,241	4,303
総計 (%)	63,366 (32.3)	132,636 (67.7)	196,002 (100.0)	923	32,046	228,971
平均	201.71	206.31	204.82	195.20	206.03	204.94
標準偏差	36.29	36.25	36.33	30.24	37.14	36.42

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査