

表 1493 降圧薬使用の有無 体重減少量(kg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満 (%)	284 (45.3)	343 (54.7)	627 (100.0)	3	125	755
0.0～ (%)	3,120 (43.3)	4,087 (56.7)	7,207 (100.0)	44	1,199	8,450
1.0～ (%)	13,337 (37.8)	21,906 (62.2)	35,243 (100.0)	178	5,604	41,025
2.0～ (%)	20,794 (32.7)	42,858 (67.3)	63,652 (100.0)	246	9,263	73,161
3.0～ (%)	9,557 (28.7)	23,747 (71.3)	33,304 (100.0)	129	4,677	38,110
4.0～ (%)	2,309 (28.0)	5,923 (72.0)	8,232 (100.0)	34	1,179	9,445
5.0～ (%)	473 (27.6)	1,238 (72.4)	1,711 (100.0)	4	243	1,958
6.0～ (%)	98 (27.7)	256 (72.3)	354 (100.0)	1	40	395
7.0～ (%)	29 (35.4)	53 (64.6)	82 (100.0)		13	95
8.0～ (%)	39 (27.5)	103 (72.5)	142 (100.0)	1	17	160
合計 (%)	50,040 (33.2)	100,514 (66.8)	150,554 (100.0)	640	22,360	173,554
記載なし (%)	484 (29.4)	1,161 (70.6)	1,645 (100.0)	38	2,972	4,655
総計 (%)	50,524 (33.2)	101,675 (66.8)	152,199 (100.0)	678	25,332	178,209
平均	2.37	2.56	2.49	2.38	2.44	2.49
標準偏差	1.05	1.05	1.05	1.07	1.04	1.05

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査