

表 1494 降圧薬使用の有無 体重減少率(%)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少率	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	1,367 (43.5)	1,776 (56.5)	3,143 (100.0)	23	530	3,696
1.0～ (%)	2,281 (40.7)	3,329 (59.3)	5,610 (100.0)	32	967	6,609
2.0～ (%)	5,420 (37.6)	9,014 (62.4)	14,434 (100.0)	71	2,416	16,921
3.0～ (%)	10,634 (35.5)	19,298 (64.5)	29,932 (100.0)	125	4,527	34,584
4.0～ (%)	13,169 (32.6)	27,179 (67.4)	40,348 (100.0)	165	5,902	46,415
5.0～ (%)	9,852 (31.1)	21,868 (68.9)	31,720 (100.0)	124	4,445	36,289
6.0～ (%)	4,665 (29.0)	11,444 (71.0)	16,109 (100.0)	59	2,259	18,427
7.0～ (%)	1,777 (28.7)	4,404 (71.3)	6,181 (100.0)	26	901	7,108
8.0～ (%)	523 (27.3)	1,395 (72.7)	1,918 (100.0)	9	268	2,195
9.0～ (%)	322 (30.2)	744 (69.8)	1,066 (100.0)	5	134	1,205
合計 (%)	50,010 (33.2)	100,451 (66.8)	150,461 (100.0)	639	22,349	173,449
記載なし (%)	514 (29.6)	1,224 (70.4)	1,738 (100.0)	39	2,983	4,760
総計 (%)	50,524 (33.2)	101,675 (66.8)	152,199 (100.0)	678	25,332	178,209
平均	4.38	4.63	4.55	4.39	4.45	4.53
標準偏差	1.67	1.63	1.65	1.74	1.67	1.65

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査