

表 1497 降圧薬使用の有無 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前クレアチニン 濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	40 (62.5)	24 (37.5)	64 (100.0)	1	11	76
2～ (%)	734 (52.3)	670 (47.7)	1,404 (100.0)	7	245	1,656
4～ (%)	3,023 (45.2)	3,669 (54.8)	6,692 (100.0)	40	1,063	7,795
6～ (%)	7,708 (37.1)	13,089 (62.9)	20,797 (100.0)	90	3,119	24,006
8～ (%)	13,015 (32.4)	27,104 (67.6)	40,119 (100.0)	154	5,842	46,115
10～ (%)	12,885 (30.9)	28,774 (69.1)	41,659 (100.0)	177	6,198	48,034
12～ (%)	8,014 (30.9)	17,901 (69.1)	25,915 (100.0)	116	3,723	29,754
14～ (%)	3,465 (33.0)	7,033 (67.0)	10,498 (100.0)	31	1,507	12,036
16～ (%)	1,212 (34.1)	2,341 (65.9)	3,553 (100.0)	23	524	4,100
合計 (%)	50,096 (33.2)	100,605 (66.8)	150,701 (100.0)	639	22,232	173,572
記載なし (%)	428 (28.6)	1,070 (71.4)	1,498 (100.0)	39	3,100	4,637
総計 (%)	50,524 (33.2)	101,675 (66.8)	152,199 (100.0)	678	25,332	178,209
平均	10.09	10.41	10.30	10.21	10.25	10.29
標準偏差	2.94	2.69	2.78	2.93	2.82	2.79

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査