

表 1498 降圧薬使用の有無 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	30 (34.1)	58 (65.9)	88 (100.0)		12	100
0.4～ (%)	61 (40.7)	89 (59.3)	150 (100.0)	1	16	167
0.6～ (%)	240 (36.1)	425 (63.9)	665 (100.0)	8	101	774
0.8～ (%)	1,285 (32.8)	2,638 (67.2)	3,923 (100.0)	31	550	4,504
1.0～ (%)	5,002 (31.2)	11,023 (68.8)	16,025 (100.0)	89	2,214	18,328
1.2～ (%)	11,371 (31.4)	24,898 (68.6)	36,269 (100.0)	186	5,196	41,651
1.4～ (%)	13,144 (32.7)	27,051 (67.3)	40,195 (100.0)	153	5,788	46,136
1.6～ (%)	8,813 (34.1)	17,066 (65.9)	25,879 (100.0)	107	3,649	29,635
1.8～ (%)	4,511 (36.4)	7,886 (63.6)	12,397 (100.0)	31	1,763	14,191
2.0～ (%)	2,794 (38.9)	4,397 (61.1)	7,191 (100.0)	12	1,163	8,366
合計 (%)	47,251 (33.1)	95,531 (66.9)	142,782 (100.0)	618	20,452	163,852
記載なし (%)	3,273 (34.8)	6,144 (65.2)	9,417 (100.0)	60	4,880	14,357
総計 (%)	50,524 (33.2)	101,675 (66.8)	152,199 (100.0)	678	25,332	178,209
平均	1.50	1.48	1.48	1.40	1.49	1.48
標準偏差	0.31	0.29	0.30	0.28	0.30	0.30

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査