

表 1499 降圧薬使用の有無 equilibrated Kt/V(eKt/V)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

equilibrated Kt/V (eKt/V)	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	47 (39.8)	71 (60.2)	118 (100.0)		16	134
0.4～ (%)	116 (36.3)	204 (63.8)	320 (100.0)	5	41	366
0.6～ (%)	831 (33.8)	1,626 (66.2)	2,457 (100.0)	26	355	2,838
0.8～ (%)	4,140 (31.5)	8,992 (68.5)	13,132 (100.0)	69	1,839	15,040
1.0～ (%)	11,539 (31.3)	25,356 (68.7)	36,895 (100.0)	206	5,294	42,395
1.2～ (%)	14,650 (32.5)	30,493 (67.5)	45,143 (100.0)	163	6,462	51,768
1.4～ (%)	9,366 (34.2)	18,011 (65.8)	27,377 (100.0)	117	3,829	31,323
1.6～ (%)	4,212 (36.6)	7,290 (63.4)	11,502 (100.0)	23	1,672	13,197
1.8～ (%)	1,475 (38.7)	2,333 (61.3)	3,808 (100.0)	7	562	4,377
2.0～ (%)	893 (42.6)	1,202 (57.4)	2,095 (100.0)	3	390	2,488
合計 (%)	47,269 (33.1)	95,578 (66.9)	142,847 (100.0)	619	20,460	163,926
記載なし (%)	3,255 (34.8)	6,097 (65.2)	9,352 (100.0)	59	4,872	14,283
総計 (%)	50,524 (33.2)	101,675 (66.8)	152,199 (100.0)	678	25,332	178,209
平均	1.31	1.29	1.29	1.22	1.30	1.29
標準偏差	0.28	0.27	0.27	0.25	0.28	0.27

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査