

表 1501 降圧薬使用の有無 %クレアチニン産生速度(%)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

%クレアチニン 産生速度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	4,623 (42.8)	6,169 (57.2)	10,792 (100.0)	77	1,681	12,550
60～ (%)	2,800 (35.4)	5,112 (64.6)	7,912 (100.0)	38	1,175	9,125
70～ (%)	3,952 (32.3)	8,269 (67.7)	12,221 (100.0)	47	1,686	13,954
80～ (%)	5,368 (31.2)	11,819 (68.8)	17,187 (100.0)	71	2,425	19,683
90～ (%)	6,526 (30.1)	15,178 (69.9)	21,704 (100.0)	93	3,061	24,858
100～ (%)	7,205 (31.1)	15,966 (68.9)	23,171 (100.0)	106	3,318	26,595
110～ (%)	6,620 (31.8)	14,203 (68.2)	20,823 (100.0)	78	2,953	23,854
120～ (%)	5,060 (33.4)	10,076 (66.6)	15,136 (100.0)	59	2,143	17,338
130～ (%)	3,009 (36.0)	5,345 (64.0)	8,354 (100.0)	34	1,220	9,608
140～ (%)	2,141 (38.1)	3,484 (61.9)	5,625 (100.0)	16	808	6,449
合計 (%)	47,304 (33.1)	95,621 (66.9)	142,925 (100.0)	619	20,470	164,014
記載なし (%)	3,220 (34.7)	6,054 (65.3)	9,274 (100.0)	59	4,862	14,195
総計 (%)	50,524 (33.2)	101,675 (66.8)	152,199 (100.0)	678	25,332	178,209
平均	97.89	99.25	98.80	94.93	98.43	98.74
標準偏差	27.85	24.84	25.88	27.05	26.44	25.96

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査